

書類⑤.大腸CT前処置手順書(午後用)

< 検査前に大腸内をきれいにする準備です >

注意事項：①検査食以外の食事はしないで下さい。食べてしまった場合、検査は中止とします。②水分(水・茶)は、こまめに飲んでいただいて大丈夫です。③体調がすぐれない・体調が悪くなったなど、やむを得ず検査を中断する場合は治療を優先してください。④この用紙は当日確認しますので必ずお持ち下さい。

あなたの検査日 → ____月 ____日
当日来院時間 → ____時 ____分 ころお越しください。

ID :

氏名 :

様

確認チェック✓!
活用ください。

前日 (月 日)

当日 (月 日)

☐ 朝食



☐ 昼食



☐ 夕食

20時まで!



☐ 就寝前

22時ころ!



☐ 朝食

朝6時まで!



☐ ①中華かゆ
注)同封のコーンスープ
は当日朝用です!

☐ ②水コップ1杯以上
(200cc以上)

☐ ①カレーライス&
コンソメスープ

☐ ②水コップ1杯以上
(200cc以上)

☐ ③コロンフォート
(1回目)
※食後30分以内

☐ ①親子丼&
お吸いもの

☐ ②水コップ1杯以上
(200cc以上)

☐ ③コロンフォート
(2回目)
※食後30分以内

【ラキソベロン内用液の服用方法】

①下の表を見て、日常の排便回数
からラキソベロンの滴下数を見ます

ラキソベロンの滴下数表

日常の排便回数	滴下数
☐ 1日3回以上	0滴
☐ 1日1回程度	15滴
☐ 2~3日に1回	20滴
☐ 4日以上なし	30滴

☐ 1日3回以上

0滴

☐ 1日1回程度

15滴

☐ 2~3日に1回

20滴

☐ 4日以上なし

30滴

②ラキソベロンを入れ、飲みます
※滴下数が「0」の場合は、
200ccの水だけ飲んでください。

コーンスープは
当日朝に飲みます



朝食用

昼食用

夕食用

中華かゆ

カレーライス・コンソメスープ

親子丼・お吸いもの

『コロンフォート』
(薄めたバリウム)
★飲み方は容器を
見てください



×3回分セット

『ラキソベロン』
(下剤)



×1回分

『マグコロール散』
(下剤)



×1回分

検査に関するお問い合わせは、
下記にお願いします。
夜間・休日は確認にお時間か
かる場合があります。

【東御市民病院】

代表 0268-62-0050

放射線科直通 0268-62-0572

☐ これ以降、検査まで水分(水、お茶)以外
口にしないでください! 水分を飲む場合
も少量をこまめにお願いします。
☐ 検査開始時、便の状態をお伺いします。

☐ 朝食後
朝7時まで!



☐ ①マグコロール散を
400ccの水で溶かし
て飲む

☐ ①コーンスープ

☐ ②水コップ1杯以上
(200cc以上)

☐ ③コロンフォート
(3回目)
※食後30分以内