

あしたは検査。
それでもやっぱり
美味しく食べたい!

大腸・CT用検査食
(内視鏡検査にも対応しています)

FG-two☆



簡単で美味しい!!本格的な味とボリューム。
検査食のイメージを変えた「FG-two☆」

前処置の負担を軽減する「おいしい検査食」です。
従来の低残渣食と比べて、ご満足いただける食事内容です。



※写真は盛りつけ例です

食事で検査を効果的にサポート。

腸管内にて水分を保持する性質がある「難消化性デキストリン」を配合。
腸管を検査に適した状態にコントロールします。



原材料

朝食用	中華粥・コーンスープ	昼食用	白飯・カレー・コンソメスープ	夕食用	白飯・親子丼のもと・お吸い物
<p>【中華粥(米飯類)】 米(タイ産)、卵、難消化性デキストリン、鶏ほぐし肉(鶏肉、なたね油、チキンエキス、食塩、酵母エキス、砂糖)、コーン油、鶏豚エキス、チキンエキスパウダー、しょうが、ほたてエキスパウダー、食塩、ねぎ油、卵加工品/増粘剤(加工デンプン、キサンタン)、調味料(アミノ酸等)、リン酸塩(Na)、香料、カロチン色素、(一部に卵・乳成分・鶏肉・豚肉・ゼラチンを含む)</p> <p>【乾燥スープ(コーンスープ)】 難消化性デキストリン、コーンパウダー、砂糖、でん粉、ミルクパウダー、乳糖、チキンエキスパウダー、食塩、オニオンパウダー、香味油、酵母エキスパウダー、香辛料/調味料(アミノ酸等)、二酸化ケイ素、香料、(一部に乳成分・鶏肉を含む)</p>	<p>【包装米飯(白飯)】 うるち米(国産)</p> <p>【具入りソース(カレー)】 野菜・果実(じゃがいも、人参、バナナ)、牛肉、小麦粉、ソテー・ド・オニオン、砂糖、食用油脂(牛脂、豚脂)、カレー粉、食塩、脱脂粉乳、鶏脂、チキンエキス、香辛料、赤ワイン、ウスターソース/カラメル色素、調味料(アミノ酸等)、酸味料、香料、(一部に小麦・乳成分・牛肉・大豆・鶏肉・バナナを含む)</p> <p>【乾燥スープ(コンソメスープ)】 難消化性デキストリン、乳糖、食塩、酵母エキスパウダー、砂糖、野菜エキスパウダー、チキンオイル、チキンエキスパウダー、香辛料/調味料(アミノ酸等)、着色料(カラメル色素、カロチン)、二酸化ケイ素、香料、酸味料、(一部に小麦・乳成分・大豆・鶏肉を含む)</p>	<p>【包装米飯(白飯)】 うるち米(国産)</p> <p>【具入りソース(親子丼のもと)】 卵、鶏肉、玉ねぎ、醤油、砂糖、みりん、かつお節エキス、コーン油、デキストリン、酵母エキス、鶏豚エキス、昆布エキス、チキンエキスパウダー、煮干しエキス、卵加工品/増粘剤(加工デンプン、キサンタン)、調味料(アミノ酸等)、リン酸塩(Na)、酸味料、香料、カロチン色素、甘味料(ステビア)、乳酸Ca、(一部に小麦・卵・乳成分・大豆・鶏肉・豚肉・ゼラチンを含む)</p> <p>【乾燥スープ(お吸い物)】 難消化性デキストリン、食塩、粉末醤油、乳糖、砂糖、しいたけエキスパウダー、かつお節パウダー/調味料(アミノ酸等)、酸味料、カラメル色素、(一部に小麦・乳成分・大豆を含む)</p>			

栄養成分表示

		内容量 (g)	エネルギー (kcal)	たんぱく質 (g)	脂質 (g)	炭水化物 (g)	食塩相当量 (g)	リン (mg)	カリウム (mg)
朝食	中華粥	200	109	3.6	2.6	17.8	0.8	40	36
	コーンスープ	18.6	70	1.5	0.3	15.2	0.9	32	67
昼食	カレーライス	280	318	7.9	4.5	61.7	1.3	94	174
	コンソメスープ	10.6	38	0.4	0.1	8.8	0.9	6	8
夕食	親子丼	280	298	10.1	4.1	55.3	1.5	149	155
	お吸い物	9.3	31	0.2	0	7.6	1.0	4	5
合計		798.5	864	23.7	11.6	166.4	6.4	325	445

<1食あたり推定値>

お召し上がり方

■お湯で温める場合

■電子レンジの場合

中華粥

パウチの封を切らずに熱湯の中に入れ、5~7分間沸騰させてください。



500Wの場合:約2分30秒
600Wの場合:約2分
必ず深めの容器に移し、ラップをかけて温めてください。



カレー・親子丼のもと

パウチの封を切らずに熱湯の中に入れ、3~4分間沸騰させてください。

500Wの場合:約1分30秒/600Wの場合:約1分10秒
必ず深めの容器に移し、ラップをかけて温めてください。

白飯

フタをはがさず、天面を上にして鍋に入れ、熱湯の中で約16分加熱してください。

500W・600W:約1分30秒
トレーのふたを点線まで開け、温めてください。

スープ・お吸い物

カップに袋の中身を入れます。



お湯160mlを注ぎ、すぐに15秒ほどかきまぜてください。

【電子レンジ使用時のご注意】

※パウチのまま電子レンジで加熱しないでください。※オート(自動あたため)機能は使用しないでください。※加熱時間は機種・W(ワット)数により異なりますので、加減してください。

■販売元

FSK 伏見製薬株式会社

〒763-8605 香川県丸亀市中津町1676 TEL 0877-22-7284 FAX 0877-22-6239

お問い合わせ先

仙台営業所 / TEL 022-295-5667
東京営業所 / TEL 03-5328-7801

名古屋営業所 / TEL 052-732-8555
大阪営業所 / TEL 06-6160-2431

中四国営業所 / TEL 0877-22-7284
福岡営業所 / TEL 092-413-4107